

## 過去の繋養種雄牛

名号	生年月日	産地	血統		間接検定					
			父	母の父	1日平均増体量(kg)	枝肉重量(kg)	枝肉歩留(%)	脂肪交雑	ロ-ス芯断面積(cm <sup>2</sup> )	枝肉等級及び頭数(全和登)
茂重波	S47.04.15	兵庫県美方町	茂金波	茂金波	0.79	306	63.7	+3.3	46	特選2 極上4 上4
武美福3	S49.04.06	兵庫県村岡町	菊則土井	田福土井	0.71	272	62.1	+3.0	39	上5 中4 並1
安美1	S53.04.16	兵庫県美方町	安美土井	茂金波	0.86	322	63.6	+3.1	43	特選1 極上2 上6
智茂	S53.03.12	小野田町	茂重波	富光	0.78	294	62.3	+3.8	40	特選3 極上3 上3
岩波	S54.07.04	岩出山町	富光	中昭	0.82	329	64.6	+3.1	55	特選1 極上3 上5 中1
波茂	S55.01.16	南郷町	茂重波	神鉄8の6	0.78	329	64.5	+3.4	51	特選5上7
秋重	S56.02.18	栗駒町	茂重波	第1九郎丸	0.88	336	63.4	+3.5	51	特選2 極上4 上2
南波竹	S56.11.02	小牛田町	茂重波	第4竹安2	0.81	327	64.3	+3.4	48	特選2 極上4 上3
宮滝	S56.11.17	広島県神石町	第31青滝	井上	0.80	337	64.8	+3.7	53	特選3 極上5
波宗	S58.11.20	宮崎町	茂重波	第3福德	0.87	340	62.3	+4.3	55	特選7 極上2
杉波	S58.02.18	鳴子町	茂重波	守1	0.86	345	64.4	+4.1	53	特選6 極上3 上1
茂糸波	S59.09.05	南方町	茂重波	第7糸桜	0.81	341	62.5	2.3	46	A4-4 A3-6
第2波茂	S59.11.02	南郷町	茂重波	神鉄8の6	0.85	352	63.5	3.0	55	A5-4 A4-4 A3-2
安谷	S60.05.02	兵庫県温泉町	安谷土井	安重土井	0.84	336	63.0	3.0	51	A5-9
南糸茂	S60.04.05	南方町	茂重波	第7糸桜	0.90	342	62.1	2.8	50	A5-4 A4-5
奥茂	S61.01.20	宮崎町	茂重波	第3福德	0.82	330	62.8	3.4	49	A5-9
善波	S62.02.03	南郷町	波茂	安美1	0.89	328	62.1	3.0	45	A5-7 A4-2
茂勝	S62.11.06	一迫町	茂重波	茂重波	0.82	332	65.3	3.1	51	A5-10
金宗	H01.12.24	南郷町	波宗	安美金	0.83	307	55.1	3.0	44	A5-7 A4-2 A3-1
金滝	H02.08.10	一迫町	宮滝	安美金	0.82	314	56.8	2.9	51	A5-9 A3-1
茂宗	H03.04.15	宮崎町	茂重波	第3福德	0.80	309	56.3	3.6	49	A5-8 A4-2
宮福茂	H04.11.21	宮崎町	茂重波	安福	0.80	316	57.2	3.3	48	A5-9 A4-1
菊宗	H05.01.17	南方町	波宗	菊谷	0.90	345	56.8	2.4	51	A5-5 A4-2 A3-2
繁奥	H08.04.04	桃生町	奥茂	茂糸波	0.88	316	55.6	3.1	48	A5-3 A4-4 A3-2 A2-1
糸昭	H09.01.27	桃生町	第2波茂	奥茂	0.96	347	57.8	2.5	45	A5-8 A4-2
茂糸桜	H06.04.04	桃生町	第7糸桜	茂重波	0.81	302	55.8	3.3	46	A5-8 A4-2 A3-1
神勝福	H09.09.11	美里町	茂勝	初代14	0.96	352	57.7	2.6	52	A5-6 A4-4
勝緑	H09.10.18	登米市米山町	茂勝	紋次郎	0.94	326	57.7	3.1	46	A5-10
憲藤	H11.03.12	大崎市松山	茂勝	宮滝	0.83	342	57.9	3.4	53	A5-8 A4-2
名号	生年月日	産地	血統		現場後代検定					
			父	母の父	枝肉重量(kg)	ロ-ス芯断面積(cm <sup>2</sup> )	バラ厚さ(cm)	BMSN o.	上物率(%)	枝肉等級及び頭数(全和登)
幸重波	H12.06.05	登米市中田町	茂糸波	秋重	407.8	50	7	5.2	39	A5-2 B5-1 A4-4 A3-4 B3-4 A2-3